

Règlement communal sur la protection et l'abattage des arbres et des haies

Annexe 2 - Liste des espèces d'arbres et arbustes indigènes proposés pour la reconstitution du milieu

Arbres	Arbustes
Aubépine à 1 style (<i>Crataegus monogyna</i>)*	Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i>)*
Aubépine à 2 styles (<i>Crataegus laevigata</i>)*	Cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i>)*
Aulne glutineux (<i>Alnus glutinosa</i>)*	Framboisier (<i>Rubus idaeus</i>)*
Bouleau pubescent (<i>Betula pubescens</i>)	Fusain d'Europe (<i>Euonymus europaeus</i>)*
Bouleau verruqueux (<i>Betula pendula</i>)*	Genêt à balais (<i>Cytisus scoparius</i>)*
Bourdaine (<i>Frangula alnus</i>)*	Groseiller à maquereaux (<i>Ribes uva-crispa</i>)
Cerisier à grappes (<i>Prunus padus</i>)*	Cassis (<i>Ribes nigrum</i>)
Charme commun (<i>Carpinus betulus</i>)	Groseiller rouge (<i>Ribes rubrum</i>)
Châtaignier (<i>Castanea sativa</i>)*	Houx (<i>Ilex aquifolium</i>)*
Chêne pédonculé (<i>Quercus robur</i>)	Nerprun purgatif (<i>Rhamnus cathartica</i>)
Chêne pubescent (<i>Quercus pubescens</i>)	Noisetier commun (<i>Corylus avellana</i>)*
Chêne sessile (<i>Quercus petraea</i>)	Ronce bleue (<i>Rubus caesius</i>)*
Cognassier (<i>Cydonia oblonga</i>)	Saule à oreillettes (<i>Salix aurita</i>)
Eglantier (<i>Rosa canina</i>)*	Saule pourpre (<i>Salix purpurea</i> var. <i>lambertiana</i>)
Erable champêtre (<i>Acer campestre</i>)*	Sureau à grappes (<i>Sambucus racemosa</i>)*
Erable plane (<i>Acer platanoides</i>)*	Sureau noir (<i>Sambucus nigra</i>)*
Erable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i>)*	Troène commun (<i>Ligustrum vulgare</i>)*
Frêne commun (<i>Fraxinus excelsior</i>)*	Viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i>)*
Griottier ou Cerisier acide (<i>Prunus cerasus</i>)	Viorne obier (<i>Viburnum opulus</i>)
Hêtre commun (<i>Fagus sylvatica</i>)	
Merisier (<i>Prunus avium</i>)*	
Myrobolan (<i>Prunus cerasifera</i>)*	
Néflier (<i>Mespilus germanica</i>)*	
Noyer commun (<i>Juglans regia</i>)*	
Orme champêtre (<i>Ulmus minor</i>)	
Orme de montagne (<i>Ulmus glabra</i>)*	
Peuplier blanc (<i>Populus alba</i>)	
Peuplier grisard (<i>Populus canescens</i>)*	
Peuplier tremble (<i>Populus tremula</i>)	
Poirier commun (<i>Pyrus communis</i>)*	
Pommier commun (<i>Malus sylvestris</i> subsp. <i>mitis</i>)*	
Prunellier (<i>Prunus spinosa</i>)*	
Prunier (<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>insititia</i>)	
Saule à trois étamines (<i>Salix triandra</i>)	
Saule blanc (<i>Salix alba</i>)*	
Saule cendré (<i>Salix cinerea</i>)*	
Saule des vanniers (<i>Salix viminalis</i>)*	
Saule fragile (<i>Salix fragilis</i>)	
Saule marsault (<i>Salix caprea</i>)*	
Sorbier des oiseleurs (<i>Sorbus aucuparia</i>)*	
Tilleul à larges feuilles (<i>Tilia platyphyllos</i>)*	
Tilleul à petites feuilles (<i>Tilia cordata</i>)*	

Les espèces marquées d'une () sont des essences mellifères.